

PROCOLE HANEY TEST

Guide de prélèvement pour analyse de terre haney test

QUAND PRÉLEVER ?

- De préférence en période humide lors de forte activité biologique
- Avant l'application de fumier ou amendement
- À une température de sol supérieur à 12°

COMMENT PRELEVER ?

Veillez respecter les mesures suivantes pour optimiser la qualité de l'analyse :

- Évitez les bordures de champs. Minimum 10m du bord de champ
- Réaliser les prélèvements **sur une parcelle homogène** avec coordonnées GPS de préférence.
- Prélever au moins 10-15 carottes dans un seau très propre puis homogénéiser vos prélèvements
- **Prélever sur une profondeur de 0 à 20 cm**
- Enlevez les cailloux et gros débris organique
- Pour les répétitions, prélever tout le temps au même endroit et à la même profondeur
- **TAILLE DE L'ECHANTILLON : 600 gr de terre par échantillon (1 sachet zip 1l)**
(Cette quantité nous permet de garder un contre échantillon en cas de problème pendant le transport par UPS)

RENSEIGNER LA FEUILLE DE PRELEVEMENT

- Indiquez la profondeur de prélèvement
- Renseignez la culture, les pratiques culturales, l'historique d'amendement

ENVOI DES ÉCHANTILLONS

- Mettez votre échantillon dans un sachet zip et y inscrire les informations essentielles au marqueur indélébile pour l'identification.
- Vos résultats seront envoyés par mail
- **Envoyer nous vos échantillons directement à :**

Symbiotik agroecologie
1 rue de la Mûre
42600 Montbrison
France